

BIOLID® UP



Composizione	Olio minerale CAS 97862-82-3 (al 95% di insulfonabilità) 80%
Formulazione	Liquido emulsionato
Gruppo	IRAC NC
N. registrazione	I4636 del 13-01-2011
Confezione	1 L (x 10), 5 L (x 4), 25 L

**Insetticida e coadiuvante per erbicidi
altamente selettivo per le colture**

CARATTERISTICHE

BIOLID UP è un olio minerale caratterizzato da elevato grado di purezza. BIOLID UP risulta altamente selettivo verso le colture arboree ed erbacee, anche nei trattamenti in fase vegetativa. Agisce prevalentemente per contatto sulle uova e sulle forme mobili degli insetti e acari. È anche indicato come coadiuvante degli erbicidi. Per individuare il momento ideale degli interventi monitorare costantemente la presenza degli insetti con le soluzioni PHEROCON (p. I46).

TUTELA DELL'AMBIENTE

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata:

12 m per pomacee

10 m per olivo, agrumi, fico, caco kiwi

7 m per drupacee, mandorlo, nocciolo e noce

3,5 m per vite da vino e da tavola

1 m per pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, melone, anguria, zucca, floreali e ornamentali e come coadiuvante di erbicidi.

Consentito in Agricoltura Biologica

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
POMACEE (melo, pero)	Psille, Acari, Eriofidi, Cocciniglie	1,5 - 2,0 l/hl (15 - 30 l/ha) max 1 trattamento 2,5 l/hl (25 l/ha) int.tratt. 15gg max 2 trattamenti	20 gg
DRUPACEE (pesco, susino, ciliegio, albicocco)	Cocciniglie, Acari	1,0 - 1,5 l/hl (10 - 22,5 l/ha) max 1 trattamento 1,0 l/hl (10 l/ha) int. tratt. 20 gg max 2 trattamenti	20 gg
VITE	Cocciniglie, Acari, Eriofidi	1,0 - 1,5 l/hl (10 - 15 l/ha) max 1 trattamento	20 gg
OLIVO	Cocciniglie	1,0 - 1,5 l/hl (12 - 30 l/ha) max 1 trattamento 0,4 - 1,0 l/hl (6 - 15 l/ha) int.tratt. 15 gg max 2 trattamenti	20 gg
NOCE, NOCCIOLO, MANDORLO	Acari, Eriofidi, Cocciniglie	1,0 - 1,5 l/hl (10 - 22,5 l/ha) max 1 trattamento 1,0 l/hl (10 l/ha) int. tratt. 20 gg max 2 trattamenti	20 gg

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
AGRUMI	Cocciniglie, Acari	1,0 - 1,5 l/hl (10 - 22,5 l/ha) max 1 trattamento	20 gg
		0,37 - 0,75 l/hl (7,4 - 15 l/ha) int. tratt. 15 gg max 2 trattamenti	
KIWI, FICO, KAKI	Cocciniglie	1,0 - 2,0 l/hl (10 - 20 l/ha) max 1 trattamento	20 gg
		1,0 - 1,5 l/hl (10 - 15 l/ha) int. tratt. 30 gg max 2 trattamenti	
SOLANACEE (pomodoro, melanzana, peperone) CUCURBITACEE (melone, anguria, cetriolo, zucca)	Acari	1,0 - 1,5 l/hl (10 - 15 l/ha) 1-2 trattamenti a 20 gg	20 gg
ORNAMENTALI E FLOREALI	Cocciniglie, Acari	1,2 - 1,8 l/hl (12 - 18 l/ha) 1-2 trattamenti	-

COADIUVANTE DI ERBICIDI DI POST-EMERGENZA
Seguire l'intervallo di sicurezza dell'erbicida utilizzato

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	0,5 - 2,0 l/ha nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli erbicidi femedifam, etofumesate, triflusaluron metile e dei graminicidi fop e dim
MAIS	5 - 10 l/ha nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli erbicidi rimsulfuron, sulcotrione, mesotrione, MCPA
SORGO	0,5 - 1,0 l/hl (1,0 - 4,0 l/ha) nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli erbicidi prosulfuron e dicamba
PATATA	0,5 - 1,0 l/hl (1,0 - 4,0 l/ha) come coadiuvante dei graminicidi specifici fop e dim e degli erbicidi PPO (es. pyraflufen-etile)
SOIA, CEREALI AUTUNNO-VERNINI, PATATA, POMODORO, FAGIOLO, PISELLO, CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO, CAROTA, CIPOLLA, AGLIO, SPINACI E SIMILI, COLZA, RISO	0,5 - 1,0 l/hl (1,0 - 4,0 l/ha) nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli erbicidi graminicidi fop e dim
SUCCHIONI-POLLONI DI: VITE, POMACEE, DRUPACEE, KIWI, NOCCIOLO, OLIVO	0,5 - 1,0 l/hl (1,0 - 4,0 l/ha) come coadiuvante dei graminicidi specifici fop e dim e degli erbicidi PPO (es. pyraflufen-etile)