

# FRUPICA

**Fungicida selettivo in polvere bagnabile ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola, Pomodoro, Floreali ed Ornamentali**

FRUPICA - Composizione:

- Mepanipyrim puro..... g. 50
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a ..... g. 100



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352).

**SIPCAM ITALIA S.p.A.**

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano  
Tel. 02.353781

Autorizzazione n. 10627 del 27.11.2000 del Ministero della Salute

Officine di produzione:

SIPCAM OXON SpA-Salerano sul Lambro (LO)  
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA-Cotignola (RA)  
TORRE Srl - Torrenieri (SI)  
DIACHEM SpA-U.P. SIFA-Caravaggio (BG)  
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)  
ADICA Srl - Faenza (RA)

Taglie: g. 100 - 200 kg 0,5 - 1 - 5

Partita n.:

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 10 metri per vite e pomodoro (coltivazione con tutore) e a 5 metri per fragola e pomodoro (coltivazione senza tutore).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri per floreali e ornamentali utilizzando ugelli con la riduzione della deriva pari al 30%.

Non applicare su suoli drenati artificialmente.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni**

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva attivo contro la Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) su Vite, Fragola, Pomodoro, Floreali ed Ornamentali. E' particolarmente efficace sulla crescita miceliare, intervenendo sull'allungamento dell'ifa e sulla formazione dell'appressorio.

E' attivo contro i ceppi di *Botrytis cinerea* resistenti ai dicarbossimidi.

## MODALITA' DI IMPIEGO

**Vite:** 1 kg/ha - Effettuare un solo trattamento per anno in post-fioritura, alla chiusura del grappolo o all'invaiaitura, oppure 3 settimane prima della raccolta.

**Fragola:** 0.8 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo di 7-10 giorni.

**Pomodoro:** 0.8 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo quindicinale.

**Floreali e Ornamentali:** 1 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte con un intervallo di 10 giorni, sia in campo che in serra.

Conformemente alla strategia anti-resistenza per il controllo della *Botrytis cinerea* che include l'impiego di Anilino Pirimidine, è consigliabile effettuare una sola applicazione per stagione, in rotazione con fungicidi a diverso meccanismo d'azione.

Non sono stati osservati effetti fitotossici su colture in serra o in pieno campo.

Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

## PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

## COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con prodotti antiparassitari a reazione alcalina, o contenenti Fosetil Alluminio, Calcio e Magnesio.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

## Sospendere i trattamenti:

**Vite: 21 giorni prima della raccolta**

**Fragola e Pomodoro: 3 giorni prima della raccolta**

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.**

# FRUPICA

**Funghicida selettivo in polvere bagnabile ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola, Pomodoro, Floreali ed Ornamentali**

FRUPICA - Composizione:  
- Mepanipirim puro ..... g. 50  
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a ..... g. 100



## INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317).  
Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).  
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## ATTENZIONE

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352).

## SIPCAM ITALIA S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. 02.353781

Autorizzazione n. 10627 del 27.11.2000 del Ministero della Salute

Officine di produzione:

SIPCAM OXON SpA-Salerano sul Lambro (LO)

DIACHEM SpA-U.P. SIFA-Caravaggio (BG)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)

CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

TORRE Srl - Torrenieri (SI)

ADICA Srl - Faenza (RA)

Taglie: g. 100

Partita n.:

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 10 metri per vite e pomodoro (coltivazione con tutore) e a 5 metri per fragola e pomodoro (coltivazione senza tutore).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri per floreali e ornamentali utilizzando ugelli con la riduzione della deriva pari al 30%.

Non applicare su suoli drenati artificialmente.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**

**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26.07.2017 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 11.09.2019*

# FRUPICA

**Fungicida selettivo in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili ad azione preventiva per la difesa di Vite, Fragola, Pomodoro, Floreali ed Ornamentali**

FRUPICA - Composizione:

- Mepanipirim puro. . . . . g. 50
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . . g. 100



**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## ATTENZIONE

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P261). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352).

**SIPCAM ITALIA S.p.A.**

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano

Tel. 02.353781

Autorizzazione n. 10627 del 27.11.2000 del Ministero della Salute

Officine di produzione:

SIPCAM OXON SpA - Salerano sul Lambro (LO)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)

TORRE Srl - Torrenieri (SI)

DIACHEM SpA-U.P. SIFA-Caravaggio (BG)

CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

ADICA Srl - Faenza (RA)

Taglie: kg. 1 (10 sacchetti da g 100)

(5 sacchetti da g 200)

(2 sacchetti da g 500)

kg. 0,5 (5 sacchetti da g 100)

Partita n.:

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 10 metri per vite e pomodoro (coltivazione con tutore) e a 5 metri per fragola e pomodoro (coltivazione senza tutore).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri per floreali e ornamentali utilizzando ugelli con la riduzione della deriva pari al 30%.

Non applicare su suoli drenati artificialmente.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO


In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni**

### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

#### MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili



1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua



2

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore




3

Mettere in funzione l'agitatore



4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.....



5

.....aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

### CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva attivo contro la Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) su Vite, Fragola, Pomodoro, Floreali ed Ornamentali. E' particolarmente efficace sulla crescita miceliare, intervenendo sull'allungamento dell'ifa e sulla formazione dell'appressorio.

E' attivo contro i ceppi di *Botrytis cinerea* resistenti ai dicarbossimidi.

### MODALITA' DI IMPIEGO

**Vite:** 1 kg/ha - Effettuare un solo trattamento per anno in post-fioritura, alla chiusura del grappolo o all'invaiaitura, oppure 3 settimane prima della raccolta.

**Fragola:** 0.8 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo di 7-10 giorni.

**Pomodoro:** 0.8 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte a partire dalla fioritura con un intervallo quindicinale.

**Floreali e Ornamentali:** 1 kg/ha - Applicare al massimo 2 volte con un intervallo di 10 giorni, sia in campo che in serra.

Conformemente alla strategia anti-resistenza per il controllo della *Botrytis cinerea* che include l'impiego di Anilino Pirimidine, è consigliabile effettuare una sola applicazione per stagione, in rotazione con fungicidi a diverso meccanismo d'azione.

Non sono stati osservati effetti fitotossici su colture in serra o in pieno campo. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con prodotti antiparassitari a reazione alcalina, o contenenti Fosetil Alluminio, Calcio e Magnesio.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### Sospendere i trattamenti:

**Vite: 21 giorni prima della raccolta**

**Fragola e Pomodoro: 3 giorni prima della raccolta**

### AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

### DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

**DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE**

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.