

Glifene Biograde

► ERBICIDA AD AZIONE FOGLIARE NON SELETTIVO PER IL CONTROLLO DI GRAMINACEE E DICOTILEDONI ANNUALI E PERENNI

COMPOSIZIONE
glifosate 31,2% (360 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato solubile (SL)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: EUH401

REG. MIN. SALUTE
n° 16831 del 07.10.2016

CODICE HRAC
G

BUFFER ZONE
Consultare il riferimento della sezione dedicata (pag. 170)

SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA	 DOSE	 FASE D'INTERVENTO	 PHI	 ATTIVITÀ ERBICIDA
Culture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato: Agrumi, Pomacee (Melo, Pero), Noce, Nocciolo, Vite e Olivo. Culture che manifestano sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato: Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettare, Pesco e Susine), Mandorlo, Actinidia, Floricole e Ornamentali, Forestali, Vivai di Pioppo	1,5-12 l/ha	Olivo da olio: nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino a 6 l/ha	7 gg Olivo da olio	Infestanti sensibili Alopecurus spp., Avena spp., Hordeum murinum, Lolium spp., Mercurialis spp., Poa spp., Riso crodo, Ammi majus., Amaranthus spp., Calendula spp., Chenopodium spp., Orobanche, Portulaca spp., Raphanus spp., Senecio spp., Sinapis spp., Stellaria spp., Veronica spp.: 1,5-4 l/ha
Culture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto: Orticole (Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello, Carota, Patata), Mais (solo interfila, non usare prima della raccolta), Oleaginose (Soia), Culture da foraggio: Prati e Pascoli (Leguminose e Graminacee), Erba medica, Barbabietola da zucchero, Rosa	Dosi proporzionali alla sensibilità dell'infestante e al tipo di attrezzatura impiegata	Trattare esclusivamente con attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia)		Agropyron repens, Carex spp., Cirsium spp., Euphorbia spp., Glyceria spp., Hypericum spp., Laersia oryzoides., Phalaris spp., Rumex spp., Sonchus spp., Sorghum halepense: 4-5 l/ha.
Terreni agrari in assenza della coltura: prima o dopo la coltivazione di Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone, Prati, Vivai		Prima della semina, prima del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo.		Alisma spp., Asfodelus spp., Butomus spp., Cyperus spp., Ferula spp., Juncus spp., Nardus spp., Scirpus spp., Sparganium spp., Tussilago spp.: 5-7 l/ha.
Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali ed industriali, Aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), Sedi ferroviarie, Argini di canali, Fossi e scoline in asciutta				Agrostis spp., Allium spp., Artemisia spp., Arundo spp., Cynodon spp., Eracleum spp., Glechoma spp., Oxalis spp., Paspalum spp., Phragmites spp., Pteridium spp., Ranunculus spp., Tiphia spp., Urtica spp., Dacus carota: 8-10 l/ha Aristolochia spp., Clematis spp., Convolvulus spp., Rubia peregrina: 12 l/ha Arbusti: Acer spp., Fraxinus spp., Genista spp., Salix spp., Sambucus spp., Vaccinium spp.: 4-6 l/ha Calluna spp., Cistus spp., Erica spp., Lonicera spp.: 10-12 l/ha



AVVERTENZE

Intervenire con infestanti emerse in attiva crescita. Effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore. Su colture arboree, non colpire foglie, germogli e parti non ben lignificate.