



PARTNER EC™

Concentrato emulsionabile
Fungicida ad azione protettiva ed eradicante ad ampio spettro d'azione per l'impiego su:

• Frumento invernale e primaverile • Orzo invernale e primaverile • Segale • Triticale

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
 H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
 H332 - Nocivo se inalato.
 H335 - Può irritare le vie respiratorie.
 H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
 H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE:

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE:

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 - NON provocare il vomito.


P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P370+378 - In caso di incendio, utilizzare schiuma, anidride carbonica, polvere secca o acqua nebulizzata per estinguere. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO:

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PERICOLO

COMPOSIZIONE:

Procloraz puro g 42,55 (= 450g/l)
 Coformulanti* q.b.a g 100

* contiene Xilene

Registrazione Ministero della Salute
 n. 14472 del 20/11/2008

Contenuto netto:

100-250-500 ml 1-2-3-5-10-20 L
 partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 m da acque superficiali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Durante la manipolazione del prodotto concentrato, indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Titolare dell'autorizzazione:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
 Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart
 Dublin 15 - Irlanda - Tel. +353 1 81 12900

Stabilimento di produzione:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
 Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart
 Dublin 15 - Irlanda - Tel. +353 1 81 12900

Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2017
 ™ Partner EC è un marchio di Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Distribuito da:

Diachem S.p.A. Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) - Tel. 0363 355611

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici. **Terapia sintomatica.**
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

È un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante. Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace contro numerose malattie fungine dei cereali.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Frumento		
Effettuare max.2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d'acqua di 200-400 L/ha.		
Malattia	Epoca d'impiego	Dose max
Cercospora (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>) Septoriosi del frumento (<i>Septoria tritici</i> e <i>Mycosphaerella graminicola</i>)	Intervenire tra l'inizio della levata e la fase di primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d'accestimento.	1 L/ha
Septoriosi della spiga (<i>Septoria nodorum</i>)	Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile) e fine spigatura. Se la malattia appare nelle foglie inferiori e in caso di condizioni favorevoli al suo sviluppo, intervenire prima possibile dopo lo stadio di foglia a bandiera. In caso di necessità ripetere l'applicazione.	1 L/ha
Oidio (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>Tritici</i>)	Intervenire prima della fine spigatura. In caso di forte pressione della malattia o in previsione di forti attacchi intervenire con un antioidico specifico.	1 L/ha
Fusariosi (<i>Fusarium nivale</i> e altre <i>Fusarium</i> spp.)	Intervenire tra l'inizio e la fine spigatura.	1 L/ha

Orzo		
Effettuare max. 2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d'acqua di 200-400 L/ha.		
Malattia	Epoca d'impiego	Dose max
Elmintosporiosi (<i>Pyrenophora teres</i> f. sp. <i>teres</i>)	Generalmente, il trattamento deve essere effettuato al primo apparire della malattia, tra la fine dell'accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d'accestimento). Se la malattia si manifesta successivamente (presenza della malattia sulle tre foglie superiori) tra le fasi di "foglia a bandiera appena visibile" e fine spigatura, intervenire immediatamente.	1 L/ha
Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Intervenire al primo apparire della malattia, tra la fine dell'accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d'accestimento). Se la malattia si manifesta successivamente (presenza della malattia sulle tre foglie superiori) tra le fasi di "foglia a bandiera appena visibile" e fine spigatura, intervenire immediatamente.	1 L/ha
Oidio (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>)	Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.	1 L/ha

Segale		
Effettuare max. 2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d'acqua di 200-400 L/ha.		
Malattia	Epoca d'impiego	Dose max
Elmintosporiosi (<i>Drechslera teres</i>)	Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.	1 L/ha
Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.	1 L/ha
Mal bianco dei cereali (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>secalis</i>)	Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.	1 L/ha

Triticale		
Effettuare max. 2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d'acqua di 200-400 L/ha.		
Malattia	Epoca d'impiego	Dose max
Septoriosi (<i>Septoria tritici</i> e <i>Mycosphaerella graminicola</i>) Cercospora (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	Intervenire tra l'inizio della levata e la fase di primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d'accestimento.	1 L/ha
Septoriosi della spiga (<i>Septoria nodorum</i>)	Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile) e fine spigatura. Se la malattia appare nelle foglie inferiori e in caso di condizioni favorevoli al suo sviluppo, intervenire prima possibile dopo lo stadio di foglia a bandiera. In caso di necessità ripetere l'applicazione.	1 L/ha
Oidio (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>Tritici</i>)	Intervenire prima della fine spigatura. In caso di forte pressione della malattia o in previsione di forti attacchi intervenire con un antioidico specifico.	1 L/ha
Fusariosi (<i>Fusarium nivale</i> e altre <i>Fusarium</i> spp.)	Intervenire tra l'inizio e la fine spigatura.	1 L/ha

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempita a metà con acqua, e mettere in funzione l'agitatore. Completare il riempimento fino al volume desiderato, mantenendo in funzione l'agitatore fino al termine della distribuzione. Effettuare il trattamento immediatamente dopo la miscelazione.

STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA RESISTENZA: PARTNER EC contiene procloraz, un fungicida inibitore della demetilazione (DMI). Sono stati accertati fenomeni di resistenza ad alcuni fungicidi DMI per quanto riguarda la Septoria, che potrebbero ridurre sensibilmente l'efficacia del prodotto. Per ulteriori informazioni sulla gestione della resistenza nei fungicidi DMI, contattare il proprio agronomo.

COMPATIBILITÀ: Colture di cereali, in modo particolare di frumento, sotto stress dovuto a siccità o ad eccessive piogge, devono essere trattate con il prodotto da solo, in quanto l'eventuale miscela con altri partner potrebbe provocare bruciature.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE A TEMPERATURE SUPERIORI A 0°C

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

CONSERVARE NEL CONTENITORE ORIGINALE BEN CHIUSO IN UN LUOGO SICURO

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SCIACQUARE A FONDO L'IMBALLAGGIO VUOTO VERSANDO L'ACQUA DI LAVAGGIO NEL SERBATOIO DELL'IRROTRATrice

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO



Concentrato emulsionabile					
Fungicida ad azione protettiva ed eradicante ad ampio spettro d'azione per l'impiego su:					
• Frumento invernale e primaverile	• Orzo invernale e primaverile	• Segale	• Triticale		
MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3					
COMPOSIZIONE:		Registrazione Ministero della Salute n. 14472 del 20/11/2008			
Procloraz puro	g 42,55 (= 450g/l)	Contenuto netto: 100 ml partita n.			
Coformulanti* q.b.a	g 100				
* contiene Xilene					
INDICAZIONI DI PERICOLO:					
H226 - Liquido e vapori infiammabili.					
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.					
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.					
H332 - Nocivo se inalato.		PERICOLO			
H335 - Può irritare le vie respiratorie.					
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.					
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.					
CONSIGLI DI PRUDENZA:					
PREVENZIONE:					
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.					
P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.					
REAZIONE:					
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.					
P331 - NON provocare il vomito.					
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.					
P370+378 - In caso di incendio, utilizzare schiuma, anidride carbonica, polvere secca o acqua nebulizzata per estinguere. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.					
SMALTIMENTO:					
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.					
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.					
Titolare dell'autorizzazione:					
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.					
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)					
Tel: + 353 (0) 1 811 2900					
Stabilimento di produzione:					
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.					
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)					
Tel: + 353 (0) 1 811 2900					
Distribuito da:					
Diachem S.p.A. Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) - Tel. 0363 355611					
Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2017					
™ Partner EC è un marchio di Barclay Chemicals (R&D) Ltd					

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE