



ORTICOLE




tempo di carenza
3
GIORNI

POMACEE



DRUPACEE



Profilo del prodotto

Principio Attivo	Flonicamid 50%
Meccanismo d'azione	IRAC 29
Formulazione	Granuli idrodispersibili (WG)
Classificazione CLP	
Reg. Ministero della Salute	12225 del 18/10/2007
Confezione	140 - 500 g

Un prodotto di: ISK BIOSCIENCES EUROPE NV, Giappone Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Belchim Crop Protection Italia Spa
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
T. 02 33599422 - 02 33576501 | F. 02 87152284
Email: belchim.italia@belchim.com | www.belchim.it

Per maggiori informazioni
inquadra il QRCode e
scarica la nostra APP



teppeki®

Insetticida sistemico per il controllo di afidi
e mosca bianca nei frutteti e nelle orticole



BELCHIM
CROP PROTECTION




La sicurezza di oggi e domani!


Unica

Flonicamid: una molecola unica con un meccanismo d'azione esclusivo


Teppeki® è un insetticida sistemico a base di Flonicamid, principio attivo appartenente alla famiglia delle piridine carbossammidi ed è caratterizzato da una sistemica acropeta e da una attività translaminare




Attività translaminare



Sistemica acropeta



Teppeki® una volta ingerito e/o assorbito per contatto determina un immediato blocco dell'alimentazione del target.



FASE 1
Suzione della linfa da parte del target dopo applicazione del Teppeki®



FASE 2
Interruzione del processo di alimentazione del target ad un'ora dal trattamento



FASE 3
Morte del target in 2-5 giorni dal trattamento

Efficace

Orticole (campo e serra)

COLTURA	TARGET	DOSE kg/ha	VOLUME D'ACQUA L/ha	MODALITÀ DI APPLICAZIONE	MOMENTO DI INTERVENTO	TRATTAMENTI/ ANNO	TEMPO DI CARENZA
Pomodoro (campo e serra)	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	0,1 - 0,12	1000	Fogliare	Alla comparsa dell'infestazione	3	3
	Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	0,2		Fertirrigazione	1 intervento dopo la crisi di trapianto ed 1 intervento dopo 10-14 gg		
Melone, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero, Zucca, Zucchini (campo e serra)	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	0,1		Fogliare	Alla comparsa dell'infestazione		
	Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	0,2		Fertirrigazione	1 intervento dopo la crisi di trapianto ed 1 intervento dopo 10-14 gg		

RACCOMANDAZIONI

Non somministrare il prodotto per fertirrigazione su piante già sviluppate. In queste condizioni la diluizione del principio attivo non garantisce il controllo dei parassiti.

MODALITÀ DELL'APPLICAZIONE

Il sistema di fertirrigazione a goccia deve essere dimensionato e regolato per assicurare una corretta bagnatura della porzione di terreno esplorata dall'apparato radicale delle piante. Il momento ottimale dell'applicazione di Teppeki® nel sistema irriguo è a partire dalla metà del tempo previsto per adacquata.

Fruttiferi

COLTURA	TARGET	DOSE Kg/ha	VOLUME D'ACQUA L/ha	MODALITA' DI APPLICAZIONE	MOMENTO DI INTERVENTO	TRATTAMENTI/ ANNO	TEMPO DI CARENZA
Agrumi	Afidi (<i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	0,1	1000-2000	Fogliare	Alla comparsa dell'infestazi- one; Trattamento ottimale in pre-fioritura	2	60
Melo	Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis pyri</i>)	0,12-0,14	1000			3	21
Pero						2	14
Pesco	35						
Susino							

Teppeki® rispetta gli insetti utili

Teppeki® è un aficida selettivo nei confronti degli insetti utili. Non ha impatto negativo sui predatori/parassitoidi naturali in grado di integrare il controllo degli afidi e degli aleurodidi presenti sulla coltura. Non risulta tossico per le api. Teppeki® è compatibile con le strategie di difesa della lotta integrata.



- Eccellente efficacia nell'applicazione preventiva
- Protezione da nuovi focolai
- Prolungata persistenza d'azione